

Los Métodos Anticonceptivos son
seguros y accesibles.
Tu Pediatra puede asesorarte para que
desde tu convicción y preferencias
elijas el adecuado.

Desde la SAP te acercamos
información segura.

Métodos Anticonceptivos

**Sociedad Argentina
de Pediatría**



Por una niñez y
adolescencia sanas,
en un mundo mejor

Av. Coronel Díaz 1971/75 (C1425DQF)
CABA - Argentina (54-11) 4821-8612
institucional@sap.org.ar
www.sap.org.ar



**Sociedad Argentina
de Pediatría**

Por una niñez y
adolescencia sanas,
en un mundo mejor

Métodos Anticonceptivos



PRESERVATIVO

Único método que evita el embarazo y previene infecciones de transmisión sexual (ITS) **Importante:** usar uno nuevo en cada relación sexual, colocar desde el comienzo de la relación antes de la penetración.



CAMPO DE LÁTEX

Previene infecciones de transmisión sexual (ITS), utilidad en relación oral/genital, y para cualquier vinculación que involucre mucosas. Tiene en cuenta vínculos homo y heterosexuales.



DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)

Método de larga duración. Evita el embarazo. Se coloca dentro del útero, requiere de un profesional de la salud y se controla periódicamente. Dura hasta 10 años y se puede quitar en cualquier momento. Es muy seguro, eficaz y reversible; después de extraído, la mujer puede quedar embarazada.



PASTILLAS E INYECTABLES

Métodos hormonales seguros, evitan el embarazo y que se produzca la ovulación. Son reversibles, una vez que se dejan de usar las mujeres pueden quedar embarazadas. Se presentan en forma de pastillas o inyecciones.



IMPLANTE SUB DÉRMICO

Método de larga duración. Es una varilla flexible del tamaño de un fósforo. Se coloca bajo la piel del brazo con anestesia local. Dura tres años, pero se puede quitar antes. Puede usarse inmediatamente luego del parto y en la lactancia ya que la hormona que contiene evita la ovulación pero no afecta la producción de leche.



PASTILLA DE EMERGENCIA

No reemplaza a los métodos anticonceptivos y es de uso excepcional. Método para prevenir embarazo en caso de falla del método anticonceptivo utilizado o después de una relación sexual sin protección por método de barrera. Debe tomarse lo antes posible. (Y hasta 5 días después de la relación sexual sin protección).

